

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

| Concentrazione di alcol nel sangue (g/L) | Sensazioni più frequenti (*) | Effetti progressivi e abilità compromesse (*) |
|--|---|---|
| 0 | Nessuna | Nessuna |
| 0.1-0.2 | Iniziale sensazione di ebbrezza Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo | Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo Iniziale riduzione del coordinamento motorio Iniziale riduzione della visione laterale Nausea |
| 0.3-0.4 | Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio | Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi Riduzione della visione laterale Vomito |
| 0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA | | |
| 0.5-0.8 | Cambiamenti dell'umore Nausea, sonnolenza Stato di eccitazione emotiva | Riduzione della capacità di giudizio Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale Riflessi alterati Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi Vomito |
| 0.9-1.5 | Alterazione dell'umore Rabbia Tristezza Confusione mentale, disorientamento | Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo Comportamenti socialmente inadeguati Linguaggio mal articolato Alterazione dell'equilibrio Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni Vomito |
| 1.6-3.0 | Stordimento Aggressività Stato depressivo Apatia Letargia | Compromissione grave dello stato psicofisico Comportamenti aggressivi e violenti Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare Stato di inerzia generale Ipotermia Vomito |
| 3.1- 4.0 | Stato di incoscienza | Allucinazioni Cessazione dei riflessi Incontinenza Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito |
| Oltre 4 | Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento Sensazione di morire | Battito cardiaco rallentato Fame d'aria Coma Morte per arresto respiratorio |

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.